TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA BIÓPSIA DA PRÓSTATA

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome:_____

Data de Nasc: ___/___/_____

Convênio:_____

– A ultrassonografia transretal é realizada introduzindo-se a sonda do aparelho pelo reto e fazendo movimentos suaves para se avaliar a próstata. A sonda é coberta por um preservativo.
– A seguir, introduz-se uma agulha através de um orifício na sonda para se efetuar a biópsia, sendo retirado em média 12 fragmentos atingindo assim as diversas regiões da próstata.
– Para que a agulha retire os fragmentos da próstata é necessário perfurar o reto, por isso o paciente deve utilizar um antibiótico para evitar a infecção da próstata por germes do reto. O antibiótico que receitamos é o TAMIRAM 500 mg **ou** LEVAQUIM 500 mg **ou** LEVOXIN 500mg **ou** TAVAFLOX 500 mg, que deverá ser iniciado no dia anterior ao exame e continuar tomando um comprimido ao dia até completar um total de 5 comprimidos.
– Em raras ocasiões, mesmo com a utilização do antibiótico, poderá ocorrer infecção da próstata, o que é chamado de prostatite aguda, assim caso ocorra febre e/ou calafrios após a biópsia o paciente deve procurar seu médico ou o pronto socorro mais próximo o mais rápido possível.
-- Fazer repouso no dia do exame e no dia seguinte ao exame.
– Nos primeiros 10 a 15 dias pode ocorrer sangramento nas fezes, na urina e até mesmo no esperma, sendo recomendável ficar sem relação sexual durante pelo menos 7 dias. Raramente ocorre sangramento em grande quantidade e caso isto ocorra também deverá ser comunicado ao seu médico.
– Caso o paciente faça uso de algum medicamento, o mesmo deverá ser comunicado ao serviço de ultrassom antes da realização do exame, pois medicamentos que contenham AAS (Aspirina, Somalgim, Melhoral, Sonrisal, Cibalena, Coristina D, Bufferin, Sinutab, Acetisil, Prevencor, Vasclin, Calmador, Doril, Antifebrin, Alicura, Analgesin, etc), e anticoagulantes como Marevam, Marcoumar, Clopidogrel, Xarelto, Pradaxa, Sintrom, Eliquis, Fenindiona, Lixiana, além da Heparina e Clexane, devem ser suspensos por pelo menos 7 dias antes do exame.
- Também comunicar se é portador de algum tipo de alergia, principalmente a látex, anestésico ou álcool iodado.
- Declaro estar ciente das condições de realização do exame e suas possíveis complicações.

Nova Lima, _____ de _____ de 2023.

Nome:_____

Assinatura:_____

OU RESPONSÁVEL LEGAL

Nome:_____

Parentesco:_____Assinatura:_____